

Sondeo N°2

“Percepciones sobre el consumo de drogas y exposición a situaciones de riesgo”

Jóvenes entre 15 y 29 años

Elaborado por Instituto Nacional de la Juventud – CADEM S.A
Agosto 2017



INJUV
Ministerio de
Desarrollo Social

Gobierno de Chile

Ficha Técnica

Técnica	: Encuestas Telefónicas con CATI.
Universo	: Hombres y Mujeres, entre 15 y 29 años, de todos los niveles socioeconómicos y residentes en todas las regiones del país.
Muestreo	: Probabilístico con selección aleatoria de hogares y por cuotas de sexo, edad, nivel socioeconómico y comuna a nivel de entrevistados.
Marco Muestral	: Registro público de teléfonos de Chile. Se construye un marco específico aleatoriamente (salto sistemático) con las comunas seleccionadas. En algunos casos se aplicó una segunda fase a través de telefonía celular. Esto cuando se ha identificado el hogar donde habita el joven y se ha localizado geográficamente.
Muestra	: 1.125 casos.
Error	: +/- 2,9 puntos porcentuales al 95% de confianza.
Ponderación	: Los datos fueron ponderados a nivel de sujetos por NSE, Zona, Sexo y Edad, obteniendo una muestra de representación nacional para el universo en estudio.
Fecha de Terreno	: Del 28 de Agosto al 11 de Septiembre de 2017.
Diferencias significativas	: Las diferencias significativas se señalan mediante la siguiente nomenclatura: en cada comparación se identifica con “*” los valores estadísticamente superiores a los identificados con “v”, considerando el nivel de confianza recién expuesto (95%)

Características de la Muestra

Distribución regional (%)		
Región	No ponderado	Ponderado
I	2,2	1,9
II	3,0	3,5
III	1,8	1,8
IV	3,6	4,4
V	10,8	10,1
VI	4,2	5,0
VII	4,7	5,8
VIII	11,6	12,0
IX	4,4	5,7
X	3,8	4,6
XI	0,4	0,6
XII	0,9	0,8
RM	45,1	40,0
XIV	2,1	2,4
XV	1,3	1,4

Distribución por Sexo (%)		
Sexo	No ponderado	Ponderado
Hombre	51,9	51
Mujer	48,1	49

Distribución por Grupo de Edad (%)		
Rangos de edad	No ponderado	Ponderado
15-19	24,6	30
20-24	37,2	34
25-29	38,2	36

Distribución por Nivel Socioeconómico (%)		
NSE	No ponderado	Ponderado
Alto (C1-C2)	39,8	29
Medio (C3)	26,8	30
Bajo (D-E)	33,3	41

Síntesis de resultados

Percepciones generales sobre drogas

- Entre las drogas más dañinas consideradas por los y las jóvenes destaca la pasta base (70%), la cocaína (52%) y las drogas sintéticas (50%), mientras que las drogas menos dañinas son la marihuana (81%) y el alcohol (53%).
- Los y las jóvenes del nivel socioeconómico bajo consideraron la pasta base como la droga más dañina en mayor medida que aquellos de niveles alto y medio. De igual manera, los y las jóvenes pertenecientes al nivel socioeconómico bajo consideran en menor medida la marihuana y al alcohol como drogas menos dañinas que las personas jóvenes de nivel socioeconómico alto y medio.
- El 89% de las personas jóvenes encuestadas consideran que los y las jóvenes consumen con mucha frecuencia alcohol y cigarrillos, respectivamente.
- Entre las y los encuestados, el 78% considera que la marihuana se consume con mucha frecuencia entre las y los jóvenes, seguido por un 17% que cree que se consume con algo de frecuencia.
- En el caso del consumo de la pasta base, un 40% cree que los y las jóvenes la consumen con poca o nada de frecuencia, mientras que quienes creen que se consume con algo de frecuencia o mucha frecuencia alcanzan un 28%, respectivamente. Aquellos jóvenes de nivel socioeconómico bajo que creen que ésta se consume con mucha frecuencia son significativamente más que en los niveles alto y medio.
- Respecto al consumo de cocaína, las y los encuestados consideran de manera pareja que es consumida con mucha (32%), algo (33%) y con poca o nada de frecuencia (32%) por las personas jóvenes.
- El 45% de los y las jóvenes considera que las drogas sintéticas se consumen con poca o nada de frecuencia, mientras que el 21% considera que su consumo entre jóvenes se realiza con mucha frecuencia.

Síntesis de resultados

Percepciones generales sobre drogas

- Frente a la situación de que una persona tome uno o dos vasos de alcohol al día, el 41% de los y las jóvenes les parece mal y al 32% le parece muy mal. Entre aquellos que les parece mal o muy mal que se consuma ese nivel de alcohol, las mujeres (78%) presentan un mayor porcentaje que los hombres (68%). Respecto a que una persona tome alcohol algunas veces al mes, 3 de cada 4 encuestados les parece ni bien ni mal.
- En el caso del consumo frecuente de marihuana, más de la mitad de los encuestados (53%) le parece ni bien ni mal y solamente al 18% le parece muy mal. Al situarse frente al consumo de marihuana una o dos veces al mes, 7 de cada 10 encuestados declaró parecerle ni bien ni mal.
- Las y los jóvenes que les parece mal o muy mal el consumo de marihuana (ya sea de manera frecuente o una o dos veces al mes) presentan mayores porcentajes en el nivel socioeconómico bajo que en los niveles alto y medio.
- A un 66% de las y los encuestados les parece muy mal que una persona consuma cocaína de manera frecuente, mientras que el 58% tiene la misma opinión con una persona que la consume una o dos veces al mes. En ambos casos, las mujeres que lo consideran mal o muy mal representan un porcentaje mayor que los hombres con la misma opinión.
- Solamente el 4% de las y los encuestados declaró que no le parece bien ni mal el consumo de pasta base de manera frecuente, porcentaje que sube al 6% cuando ésta se consume una o dos veces al mes.
- Al 67% de los encuestados le parece mal que una persona consuma drogas sintéticas de manera frecuente. Este porcentaje baja al 58% cuando se sitúa el consumo en una o dos veces al mes.

Síntesis de resultados

Percepciones generales sobre drogas

- ▶ Frente a la afirmación “*En general, en un carrete se pasa mejor cuando se bebe alcohol que cuando no se bebe*”, un 54% se mostró en desacuerdo y muy en desacuerdo.
- ▶ Frente a la afirmación “*Las drogas legales, como el alcohol o el cigarrillo, son igual de dañinas que las drogas ilegales*”, un 73% se declaró muy de acuerdo y de acuerdo.
- ▶ Frente a la afirmación “*En general, el consumo de drogas es mayor entre jóvenes de nivel socioeconómico bajo, que en niveles socioeconómicos medio y alto*”, un 42% se declaró en desacuerdo y muy en desacuerdo, y un 31% muy de acuerdo y de acuerdo.
- ▶ Frente a la frase “*Actualmente, los jóvenes están más informados sobre los riesgos asociados al consumo de drogas*”, un 65% se declaró muy de acuerdo y de acuerdo.
- ▶ Frente a la frase “*En términos generales, las campañas contra el consumo de drogas han logrado reducir en parte su consumo*”, un 55% se declaró en desacuerdo y muy en desacuerdo.
- ▶ Frente a la frase “*El acceso a drogas más sofisticadas es mayor en jóvenes de nivel socioeconómico alto que en los niveles socioeconómicos medio y bajo*”, un 54% se declaró muy de acuerdo y de acuerdo.

Síntesis de resultados

Situaciones de riesgo vinculadas al consumo de drogas

- Las situaciones de riesgo más asociadas al consumo de alcohol son los problemas familiares (37%) y los accidentes de tránsito (26%). En el caso de la asociación del alcohol con problemas familiares, los y las jóvenes del nivel socioeconómico medio lo asocian en mayor medida que en los niveles alto y bajo.
- Principalmente, el consumo de cigarrillo estuvo asociado con las siguientes situaciones de riesgo: problemas de salud (44%) y problemas familiares (18%). Entre quienes lo asocian con problemas de salud, existe un mayor porcentaje en: la Región Metropolitana (48%) que en el resto de las regiones (41%); las y los jóvenes mayores de 25 años (47%) que aquellos que tienen entre 20 y 24 años (39%); y los de nivel socioeconómico alto (49%) que los de nivel bajo (39%).
- En el caso del consumo de la marihuana, el 30% de las y los encuestados asoció su consumo con problemas familiares y el 19% con dificultades en los estudios. Destaca un 13% que no asoció la marihuana con ninguna de las situaciones de riesgo.
- Las situaciones de riesgo con las que se asoció principalmente el consumo de pasta base fue con problemas familiares (46%) y con peleas o riñas (27%). En el caso de la asociación con problemas familiares, las y los jóvenes de nivel socioeconómico alto (52%) presentan un porcentaje estadísticamente mayor que los de nivel socioeconómico bajo (41%) que lo asocia al consumo de pasta base, lo que se replica también en la Región Metropolitana (52%) respecto al resto de las regiones (42%).
- Respecto al consumo de cocaína, el 40% de las y los encuestados lo asoció con problemas familiares y un 27% lo asoció con peleas o riñas. Las mujeres que asociaron su consumo con problemas familiares (43%) son estadísticamente más que en el caso de los hombres (37%), al igual que quienes pertenecen al nivel socioeconómico medio (44%) sobre los pertenecientes al nivel socioeconómico bajo (36%).
- Un 35% de las y los jóvenes encuestados asoció el consumo de drogas sintéticas con problemas familiares, seguido de un 20% que lo asoció con peleas o riñas.

Síntesis de resultados

Situaciones de riesgo vinculadas al consumo de drogas

- El 28% de las y los encuestados declaró que en los últimos 12 meses se subió a un vehículo conducido por una persona que haya consumido alcohol. Un 10% afirmó que en los últimos 12 meses ha perdido la memoria o la consciencia luego del consumo de alcohol.
- Entre quienes en los últimos 12 meses han realizado o le ha sucedido alguna de las situaciones de riesgo consultadas, exceptuando la pérdida de la memoria o la consciencia debido al consumo de alcohol, destaca el mayor porcentaje de hombres que mujeres quienes declaran que les han sucedido alguna de ellas.
- Los dos principales resguardos que utilizan los y las jóvenes al momento de participar en fiestas o carretes es volver a su casa en taxi, uber, radiotaxi o cabify (34%) y no tomar alcohol o consumir casi nada (30%).
- Entre aquellos jóvenes que vuelven a su casa en taxi, uber, radiotaxi o cabify, los mayores de 20 años presentan mayores porcentajes que aquellos menores de 15 años que lo realizan; lo que también es señalado en mayor porcentaje por las personas jóvenes de niveles socioeconómicos alto y medio, por sobre los de nivel bajo. Adicionalmente, quienes proporcionalmente más señalan que se quedan a dormir en el lugar de la fiesta son las personas jóvenes entre 15 y 19 años.



Módulo 1:


Percepciones generales sobre

droga

Percepción drogas más dañinas

De las siguientes sustancias, en tu opinión, ¿cuál es la sustancia más dañina para la salud de quien la consume? ¿Y en segundo lugar? %

■ Total Menciones ◆ Primera Mención



Entre las drogas consultadas, el 70% de los y las jóvenes consideran que la pasta base es la droga más dañinas para la salud de quien la consume, seguido por la cocaína (52%) y las drogas sintéticas (50%).

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde”

*Se consideran como drogas sintéticas: Éxtasis, LSD, Nbome, ketamina, cocaína rosada, etc.

Percepción drogas más dañinas

De las siguientes sustancias, en tu opinión, ¿cuál es la sustancia más dañina para la salud de quien la consume? ¿Y en segundo lugar?

% Total menciones

	TOTAL	SEXO		EDAD			NSE			ZONA	
		Hombre	Mujer	15-19	20-24	25-29	Alto	Medio	Bajo	RM	Regiones
Pasta base	70	72	67	67	70	71	65▼	67▼	75★	72	68
Cocaína	52	53	52	53	54	50	54	51	52	56★	50▼
Drogas sintéticas	50	46▼	53★	48	48	52	56★	53★	43▼	44▼	53★
Alcohol	13	12	14	13	14	12	9▼	13	16★	13	13
Cigarrillo	11	12	9	13	11	9	12	12	8	11	11
Marihuana	4	4	4	5	3	4	2▼	3	5★	3	4

Frente a la percepción dañina de las drogas consultadas, existen diferencias estadísticamente significativas en los cruces de sexo, NSE y zona. Los y las jóvenes pertenecientes al nivel socioeconómico bajo consideran la pasta base como la droga más dañina respecto a los de niveles alto y medio. Caso contrario ocurre con la drogas sintéticas, donde las personas jóvenes de niveles socioeconómico alto y medio las consideran drogas más dañinas que los de nivel bajo. En el caso de la cocaína, los y las jóvenes de la Región Metropolitana la consideran en mayor medida una droga más dañina que en el resto de las regiones.


Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde”

*Se consideran como drogas sintéticas: Éxtasis, LSD, Nbome, ketamina, cocaína rosada, etc.

Percepción drogas menos dañinas

De las siguientes sustancias, en tu opinión, ¿cuál es la sustancia menos dañina para la salud de quien la consume? ¿Y en segundo lugar? %

■ Total Menciones ◆ Primera Mención



Entre las drogas consultadas, las y los jóvenes consideran que la menos dañina es la marihuana (81%), seguida por el alcohol (53%) y el cigarillo (41%). El resto de las drogas no alcanzan un total de menciones superior al 5%.

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde”

***Se consideran como drogas sintéticas: Éxtasis, LSD, Nbome, ketamina, cocaína rosada, etc.**

Percepción drogas menos dañinas

De las siguientes sustancias, en tu opinión, ¿cuál es la sustancia menos dañina para la salud de quien la consume? ¿Y en segundo lugar?

% Total menciones

	TOTAL	SEXO		EDAD			NSE			ZONA	
		Hombre	Mujer	15-19	20-24	25-29	Alto	Medio	Bajo	RM	Regiones
Marihuana	81	80	81	81	81	80	85★	84★	75▼	83	80
Alcohol	53	56★	50▼	54	52	53	66★	59★	40▼	51	55
Cigarrillo	41	39	43	38	40	44	33	43	44	41	41
Drogas sintéticas	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4
Cocaína	3	4	3	4	4	3	1▼	1▼	6★	6★	2▼
Pasta base	3	3	3	3	3	3	0▼	1▼	6★	4	2


Frente a la percepción sobre la droga menos dañina, existen diferencias estadísticamente significativas en los cruces de sexo, NSE y zona. Los hombres son quienes en un menor porcentaje que las mujeres consideran al alcohol como una de las drogas menos dañinas. En el caso de los y las jóvenes de nivel socioeconómico bajo, estos consideran en menor medida a la marihuana y al alcohol como drogas menos dañinas que los de niveles alto y medio. En el caso de la cocaína, los y las jóvenes de la Región Metropolitana la consideran en mayor medida una droga menos dañina que en el resto de las regiones.

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde”


*Se consideran como drogas sintéticas: Éxtasis, LSD, Nbome, ketamina, cocaína rosada, etc.

Percepción sobre frecuencia de consumo: Alcohol

Según tu opinión ¿con qué frecuencia los jóvenes consumen las siguientes sustancias...?




El 89% de las personas jóvenes cree que en general los y las jóvenes consumen alcohol con mucha frecuencia. La y los que consideran que los jóvenes consumen alcohol con mucha frecuencia son sobre todo las mujeres (91%) y las personas jóvenes de nivel socioeconómico alto (92%).




Muestra: 1.125. Se omiten categorías "No sabe" y "No responde" en gráficos de barras.

Percepción sobre frecuencia de consumo: Cigarrillo

Según tu opinión ¿con qué frecuencia los jóvenes consumen las siguientes sustancias...?




El 89% de las personas jóvenes cree que en general los jóvenes consumen cigarrillos con mucha frecuencia. Esto es compartido por los y las jóvenes entre 20 y 24 años en mayor medida que aquellos entre los 15 y 19 años.




Muestra: 1.125. Se omiten categorías "No sabe" y "No responde" en gráficos de barras.

Percepción sobre frecuencia de consumo: Marihuana

Según tu opinión ¿con qué frecuencia los jóvenes consumen las siguientes sustancias...?




El 78% de los encuestados piensa que los y las jóvenes consumen marihuana con mucha frecuencia, seguido por un 17% que cree que se consume con algo de frecuencia. Los y las jóvenes de nivel socioeconómico alto (20%) consideran en mayor medida que la marihuana se consume con algo de frecuencia que aquellos de nivel bajo (14%). De igual manera, los y las jóvenes que viven en la Región Metropolitana (14%) y que consideran que la marihuana se consume con algo de frecuencia son menos que en el resto de las regiones (19%).



Muestra: 1.125. Se omiten categorías "No sabe" y "No responde" en gráficos de barras.


Percepción sobre frecuencia de consumo: Pasta base

Según tu opinión ¿con qué frecuencia los jóvenes consumen las siguientes sustancias...?



Respecto al consumo de pasta base, el 40% de las y los entrevistados cree que los jóvenes la consumen con poca o nada de frecuencia, mientras que aquellos que creen que se consume con mucha o algo de frecuencia alcanzan el 28%, respectivamente. Los y las jóvenes entre 25 y 29 años creen en menor medida que los menores de 24 años que la pasta base se consume con poca o nada de frecuencia. Aquellos de nivel socioeconómico bajo que consideran que la pasta base se consume con mucha frecuencia son significativamente más que en los niveles alto y medio.


■ % Poca frecuencia - Nada de frecuencia ■ % Algo de frecuencia ■ % Mucha frecuencia




Muestra: 1.125. Se omiten categorías "No sabe" y "No responde" en gráficos de barras.

Percepción sobre frecuencia de consumo: Cocaína

Según tu opinión ¿con qué frecuencia los jóvenes consumen las siguientes sustancias...?




En el caso de la frecuencia de consumo de cocaína, las y los encuestados consideran de manera pareja que se consume con mucha (32%), algo (33%) y con poca o nada frecuencia (32%). Las personas jóvenes pertenecientes al nivel socioeconómico alto (42%) consideran en mayor medida que el consumo de cocaína entre jóvenes ocurre con poca o nada frecuencia, respecto a los niveles medio (33%) y bajo (26%). En el caso de los y las jóvenes mayores de 25 años, quienes creen que se consume con mucha frecuencia son significativamente más que aquellos menores de 24 años.




Muestra: 1.125. Se omiten categorías "No sabe" y "No responde" en gráficos de barras.

Percepción sobre frecuencia de consumo: Drogas sintéticas

Según tu opinión ¿con qué frecuencia los jóvenes consumen las siguientes sustancias...?



El 45% de los y las jóvenes considera que las drogas sintéticas se consumen con poca o nada de frecuencia, mientras que el 21% considera que su consumo se realiza con mucha frecuencia. Es menor el porcentaje de jóvenes de nivel socioeconómico bajo (39%) que aquellos de los niveles alto (51%) y medio (47%), quienes creen que se consume con poca o nada de frecuencia




Muestra: 1.125. Se omiten categorías "No sabe" y "No responde" en gráficos de barras.

*Se consideran como drogas sintéticas: Éxtasis, LSD, Nbome, ketamina, cocaína rosada, etc.

Percepción frente al consumo: Alcohol

En tu opinión, qué te parece que una persona...?




	% Me parece mal + Me parece muy mal	TOTAL	SEXO		EDAD			NSE			ZONA	
			Hombre	Mujer	15-19	20-24	25-29	Alto	Medio	Bajo	RM	Regiones
Tome uno o dos vasos de alcohol al día	73	73	68 ▽	78 ★	70	72	76	74	75	71	75	72
Tome alcohol algunas veces al mes	25	25	23	27	29 ★	24	22 ▽	13 ▽	21 ★	36 ★	22	27

Al 41% de los y las jóvenes les parece mal que una persona tome uno o dos vasos de alcohol al día, mientras que al 32% le parece muy mal. En un mayor porcentaje las mujeres consideran que les parece mal o muy mal que se consuma ese nivel de alcohol a diferencia de los hombres (78% y 68%, respectivamente). Por otro lado, alrededor al 74% de las personas jóvenes les parece ni bien ni mal que una persona tome alcohol algunas veces al mes. Las y los jóvenes pertenecientes al nivel socioeconómico bajo (36%) y medio (21%), que les parece mal o muy mal, son significativamente más que los que señalan lo mismo del nivel socioeconómico alto (13%).

Muestra: 1.125.

Percepción frente al consumo: Marihuana

En tu opinión, qué te parece que una persona...?




	% Me parece mal + Me parece muy mal	TOTAL	SEXO		EDAD			NSE			ZONA	
			Hombre	Mujer	15-19	20-24	25-29	Alto	Medio	Bajo	RM	Regiones
Fume marihuana de manera frecuente	45	45	45	47	42	46	39	42	51	45	45	
Fume marihuana una o dos veces al mes	29	28	30	29	29	30	23	24	37	26	31	

Más de la mitad de las y los encuestados (53%) les parece ni bien ni mal que una persona fume marihuana de manera frecuente. Mientras que solo al 18% le parece algo muy malo. Por otro lado, el 70% declaró parecerle ni bien ni mal que una persona consuma marihuana una o dos veces al mes. Las y los jóvenes que les parece mal o muy mal el consumo de marihuana (ya sea de manera frecuente o una o dos veces al mes) presentan mayores porcentajes en el nivel socioeconómico bajo que en los niveles alto y medio.

Muestra: 1.125.

Percepción frente al consumo: Cocaína

En tu opinión, qué te parece que una persona...?




% Me parece mal + Me parece muy mal	TOTAL	SEXO		EDAD			NSE			ZONA	
		Hombre	Mujer	15-19	20-24	25-29	Alto	Medio	Bajo	RM	Regiones
Consuma cocaína de manera frecuente	92	91 ▼	94 ★	90	94	93	94 ★	94 ★	90 ▼	94	91
Consuma cocaína una o dos veces al mes	89	86 ▼	92 ★	87	90	90	90	87	90	88	90

Entre los y las jóvenes encuestados, el 66% declaró que le parece muy mal que una persona consuma cocaína de manera frecuente, mientras que el 58% tiene la misma opinión frente a una persona que consume cocaína una o dos veces al mes. Las mujeres que les parece mal o muy mal que se consuma cocaína de manera frecuente o una a dos veces al mes (94% y 92%, respectivamente) son estadísticamente más que los hombres (91% y 86%, respectivamente).

Muestra: 1.125.

Percepción frente al consumo: Pasta base

En tu opinión, qué te parece que una persona...?




	% Me parece mal + Me parece muy mal	TOTAL	SEXO		EDAD			NSE			ZONA	
			Hombre	Mujer	15-19	20-24	25-29	Alto	Medio	Bajo	RM	Regiones
Consuma pasta base de manera frecuente	96	96	95	96	95	96	96	97★	98★	92▼	96	95
Consuma pasta base una o dos veces al mes	94	94	92	95	92▼	93	96★	96★	94	92▼	94	93

El 4% de las y los encuestados les parece ni bien ni mal que una persona consuma pasta base de manera frecuente, mientras que la misma opinión alcanza al 6% frente a una persona que consume pasta base una o dos veces al mes. Los y las jóvenes que les parece mal o muy mal que una persona consuma pasta base una o dos veces al mes se presenta en mayor medida entre aquellos que tienen entre 25 y 29 años (96%) y aquellos pertenecientes al nivel socioeconómico alto (96%), comparativamente a las y los jóvenes que tienen entre 15 y 19 años (92%) y que pertenecen al nivel socioeconómico bajo (92%).

Muestra: 1.125.

Percepción frente al consumo: Drogas sintéticas

En tu opinión, qué te parece que una persona...?



% Me parece mal + Me parece muy mal	TOTAL	SEXO		EDAD			NSE			ZONA	
		Hombre	Mujer	15-19	20-24	25-29	Alto	Medio	Bajo	RM	Regiones
Consuma drogas sintéticas de manera frecuente	91	90	92	87▼	92★	93★	93	90	90	89▼	92★
Consuma drogas sintéticas una o dos veces al mes	86	85	88	83▼	87	89★	87	86	86	84	88


Al 67% de las y los encuestados le parece mal que una persona consuma drogas sintéticas de manera frecuente. Este porcentaje baja al 58% cuando se sitúa el consumo en una o dos veces al mes. Los y las jóvenes a los que les parece mal o muy mal que se consuman drogas sintéticas de manera frecuente, se concentran mayormente en el resto de las regiones en comparación con las personas jóvenes de la Región Metropolitana. Adicionalmente, esta opinión la comparten más los mayores de 20 años que aquellos entre 15 y 19 años. En el caso del consumo de drogas sintéticas uno o dos veces al mes, a las y los jóvenes entre 25 y 29 años les parece mal o muy mal en mayor porcentaje que aquellos entre 15 y 19 años.

Muestra: 1.125.


*Se consideran como drogas sintéticas: Éxtasis, LSD, Nbome, ketamina, cocaína rosada, etc.

“En general, en un carrete se pasa mejor cuando se bebe alcohol que cuando no se bebe”

¿Me podrías decir qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con la siguiente frase?




El 54% de las y los encuestados está en desacuerdo y muy en desacuerdo respecto a que con alcohol se pasa mejor en un carrete. Las personas jóvenes que están en desacuerdo y muy en desacuerdo, son sobre todo las mujeres (61%), jóvenes de nivel socioeconómico alto (57%) y medio (62%) y las personas jóvenes entre 20 a 24 años (58%).




Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” en gráficos de barras.

“Las drogas legales, como el alcohol o el cigarrillo, son igual de dañinas que las drogas ilegales”

¿Me podrías decir qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases?




El 73% de jóvenes declaró estar muy de acuerdo y de acuerdo con que las drogas legales son igual de dañinas que las ilegales. Las y los jóvenes de nivel socioeconómico alto (74%) y medio (82%) que están de acuerdo con la afirmación son estadísticamente más que aquellos del nivel bajo (67%).




Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” en gráficos de barras.

“En general, el consumo de drogas es mayor entre jóvenes de nivel socioeconómico bajo, que en niveles socioeconómicos medio y alto”

¿Me podrías decir qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases?




El 42% de los y las jóvenes declararon estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con que el consumo de drogas es mayor en el nivel socioeconómico bajo que en los niveles medio y alto. Quienes proporcionalmente más están en desacuerdo y muy en desacuerdo con ello son las personas jóvenes de nivel socioeconómico alto (52%) y medio (43%), y las y los jóvenes entre 25 y 29 años (47%).




Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” en gráficos de barras.

“Actualmente, los jóvenes están más informados sobre los riesgos asociados al consumo de drogas”

¿Me podrías decir qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases?




El 65% declaró estar muy de acuerdo y de acuerdo con que actualmente los jóvenes están más informados sobre los riesgos asociados al consumo de drogas. Quienes más declaran estar muy de acuerdo y de acuerdo son las y los jóvenes entre 20 y 24 años (70%), y las personas jóvenes de nivel socioeconómico medio (70%).




Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” en gráficos de barras.

“En términos generales, las campañas contra el consumo de drogas han logrado reducir en parte su consumo”

¿Me podrías decir qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases?




Más de la mitad de los y las encuestados (55%) declaró estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con que las campañas contra el consumo de drogas han logrado reducir su consumo. Quienes proporcionalmente más están en desacuerdo y muy en desacuerdo con ello son las y los jóvenes entre 20 y 24 años (57%), jóvenes de nivel socioeconómico alto (61%) y medio (57%), y las personas jóvenes de la Región Metropolitana (59%).




Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” en gráficos de barras.

“El acceso a drogas más sofisticadas es mayor en jóvenes de nivel socioeconómico alto que en los niveles socioeconómicos medio y bajo”

¿Me podrías decir qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases?



En cuanto a la afirmación “el acceso a drogas más sofisticadas es mayor en jóvenes de nivel socioeconómico alto que en los niveles socioeconómicos medio y bajo”, el 54% declaró estar muy de acuerdo y de acuerdo con ello, mientras que el 23% afirmó estar en desacuerdo y muy en desacuerdo. Las y los jóvenes de nivel socioeconómico alto y medio presentan un mayor porcentaje de acuerdo con la afirmación (59% y 60%, respectivamente) que aquellos del nivel socioeconómico bajo (46%).



Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” en gráficos de barras.




Módulo 2:

Situaciones de riesgo vinculadas al consumo de drogas

Asociación con situaciones de riesgo. Alcohol

Principalmente, ¿con cuál de estas situaciones crees tú que está más relacionado el consumo de las siguientes sustancias? %



	TOTAL	SEXO		EDAD			NSE			ZONA	
		Hombre	Mujer	15-19	20-24	25-29	Alto	Medio	Bajo	RM	Regiones
Problemas familiares	37	37	37	37	37	36	35▼	43★	34▼	36	37
Accidentes de tránsito	26	25	27	23▼	24	30★	33★	24▼	22▼	24	27
Peleas o riñas	20	20	20	18	22	20	18	17	23	21	19
Problemas de salud	7	8	5	8	7	6	4▼	4▼	10★	7	6
Dificultades laborales	5	6	4	7	5	4	5	5	5	5	5
Dificultades con los estudios	2	2	2	3★	3★	1▼	2	4★	1▼	3	2
Ninguna de las anteriores	3	2	3	3	1	3	2	1▼	4★	3	2

Las situaciones de riesgo más asociadas al consumo de alcohol son los problemas familiares (37%) y los accidentes de tránsito (26%). Los y las jóvenes del nivel socioeconómico medio que asocian el alcohol con problemas familiares son estadísticamente más que aquellos de niveles alto y bajo. En el caso de quienes asocian el alcohol con los accidentes de tránsito, los de nivel socioeconómico alto son estadísticamente más que aquellos de niveles medio y bajo.

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde”

Asociación con situaciones de riesgo. Cigarrillo

Principalmente, ¿con cuál de estas situaciones crees tú que está más relacionado el consumo de las siguientes sustancias? %




	TOTAL	SEXO		EDAD			NSE			ZONA	
		Hombre	Mujer	15-19	20-24	25-29	Alto	Medio	Bajo	RM	Regiones
Problemas de salud	44	45	42	45	39 ▽	47 ★	49 ★	46	39 ▽	48 ★	41 ▽
Problemas familiares	18	17	19	18	20 ★	15 ▽	16 ▽	22 ★	16	17	18
Dificultades laborales	11	10	13	10	12	11	13 ★	15 ★	7 ▽	11	11
Dificultades con los estudios	10	9	10	10	11	8	10	10	10	9	10
Peleas o riñas	4	3	5	3	5	3	1 ▽	3	6 ★	4	4
Accidentes de tránsito	2	2	2	3	2	1	2	1 ▽	3 ★	1	3
Ninguna de las anteriores	9	11	8	9	8	11	7 ★	3 ▽	16 ★	8	10

El 44% de las y los encuestados asoció el consumo de cigarrillos con problemas de salud, seguido por el 18% que asoció su consumo a problemas familiares. Entre quienes lo asocian con problemas de salud, existe un mayor porcentaje en: la Región Metropolitana (48%) que en el resto de las regiones (41%); las y los jóvenes mayores de 25 años (47%) que aquellos que tienen entre 20 y 24 años (39%); y los de nivel socioeconómico alto (49%) que los de nivel bajo (39%).

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde”

Asociación con situaciones de riesgo. Marihuana

Principalmente, ¿con cuál de estas situaciones crees tú que está más relacionado el consumo de las siguientes sustancias? %




	TOTAL	SEXO		EDAD			NSE			ZONA	
		Hombre	Mujer	15-19	20-24	25-29	Alto	Medio	Bajo	RM	Regiones
Problemas familiares	30	28	32	34★	30	27▼	30	33	28	32	29
Dificultades con los estudios	19	21	17	19	22	18	25★	22★	14▼	20	19
Problemas de salud	15	13	17	11▼	16★	16	17★	17	12▼	12▼	17★
Dificultades laborales	10	10	9	7	10	11	11	10	8	9	10
Peleas o riñas	7	8	6	7	6	8	4▼	8	9★	6	8
Accidentes de tránsito	3	3	4	5★	3	2▼	2▼	3	5★	4	3
Ninguna de las anteriores	13	13	13	14	10▼	15★	9▼	6▼	21★	15	11

Respecto al consumo de marihuana, el 30% de las y los encuestados asoció su consumo con problemas familiares y el 19% con dificultades con los estudios. Destaca un 13% que no asoció la marihuana con ninguna de las situaciones de riesgo. Entre aquellos que lo asocian con problemas familiares, las personas jóvenes entre 15 y 19 años presentan un porcentaje significativamente mayor que aquellos mayores de 25 años. En el caso de la asociación con dificultades en los estudios, los pertenecientes al nivel socioeconómico bajo son menos que aquellos de niveles alto y medio.

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde”

Asociación con situaciones de riesgo. Pasta Base

Principalmente, ¿con cuál de estas situaciones crees tú que está más relacionado el consumo de las siguientes sustancias? %



	TOTAL	SEXO		EDAD			NSE			ZONA	
		Hombre	Mujer	15-19	20-24	25-29	Alto	Medio	Bajo	RM	Regiones
Problemas familiares	46	47	45	46	46	46	52★	47	41▼	52★	42▼
Peleas o riñas	27	27	27	22▼	28	30★	27	30	25	24	29
Problemas de salud	10	9	11	13	9	8	9	8	12	9	10
Dificultades laborales	4	4	5	3	5	6	4	5	4	4	5
Dificultades con los estudios	4	5	3	6	4	4	3	5	5	4	4
Accidentes de tránsito	3	2	4	3	4	2	1▼	2▼	5★	1▼	4★
Ninguna de las anteriores	3	3	2	4	2	2	2	2	4	3	3

El consumo de pasta base fue asociado principalmente con problemas familiares (46%) y peleas o riñas (27%). Entre quienes lo asociaron con problemas familiares, el nivel socioeconómico alto (52%) presenta un porcentaje estadísticamente mayor que el nivel bajo (41%), ocurriendo lo mismo en la Región Metropolitana (52%) respecto al resto de las regiones (42%).

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde”

Asociación con situaciones de riesgo. Cocaína

Principalmente, ¿con cuál de estas situaciones crees tú que está más relacionado el consumo de las siguientes sustancias? %



	TOTAL	SEXO		EDAD			NSE			ZONA	
		Hombre	Mujer	15-19	20-24	25-29	Alto	Medio	Bajo	RM	Regiones
Problemas familiares	40	37▼	43★	42	42	37	42	44★	36▼	42	39
Peleas o riñas	27	28	25	22▼	31★	26	28★	31★	22▼	25	28
Problemas de salud	10	10	10	12	9	10	8	9	12	11	10
Dificultades laborales	9	9	9	9	6▼	11★	12★	5▼	10★	11	8
Dificultades con los estudios	5	6	5	5	5	5	5	4	6	5	5
Accidentes de tránsito	4	4	3	3	4	4	2▼	2▼	6★	3	4
Ninguna de las anteriores	3	4	2	5	2	3	2▼	2▼	5★	3	4

El 40% de las y los encuestados declaró asociar el consumo de cocaína con problemas familiares, seguido de un 27% que lo asoció con peleas o riñas. Las mujeres que asociaron su consumo con problemas familiares (43%) son estadísticamente más que los hombres (37%), al igual que quienes pertenecen al nivel socioeconómico medio (44%) sobre los pertenecientes al bajo (36%).

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde”

Asociación con situaciones de riesgo. Drogas Sintéticas

Principalmente, ¿con cuál de estas situaciones crees tú que está más relacionado el consumo de las siguientes sustancias? %



	TOTAL	SEXO		EDAD			NSE			ZONA	
		Hombre	Mujer	15-19	20-24	25-29	Alto	Medio	Bajo	RM	Regiones
Problemas familiares	35	35	36	35	37	34	37	36	34	37	34
Peleas o riñas	20	19	21	18	19	22	19	24★	17▼	16▼	22★
Problemas de salud	13	14	11	14	13	11	12	11	14	14	12
Dificultades con los estudios	10	9	11	10	12	9	13★	12★	6▼	11	9
Accidentes de tránsito	8	7	9	6▼	6▼	11★	7	6	10	6	9
Dificultades laborales	6	7	5	8	5	6	6	5	7	7	6
Ninguna de las anteriores	4	5	3	6	4	3	4	2▼	6★	4	4


Las situaciones de riesgo asociadas al consumo de drogas sintéticas con mayor porcentaje son problemas familiares (35%), seguido de peleas o riñas (20%). Quienes asocian su consumo con peleas o riñas son sobre todo jóvenes del resto de las regiones (22%) que los de la Región Metropolitana (16%), y las personas jóvenes de nivel socioeconómico medio (24%) que en el bajo (17%).

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde”

*Se consideran como drogas sintéticas: Éxtasis, LSD, Nbome, ketamina, cocaína rosada, etc.

Exposición a situaciones de riesgo

Pensando en los últimos 12 meses, ¿te ha sucedido alguna de las siguientes situaciones?



El 28% de las y los encuestados declaró que en los últimos 12 meses se subió a un vehículo conducido por una persona que haya consumido alcohol. Un 10% afirmó que en los últimos 12 meses ha perdido la memoria o la consciencia luego del consumo de alcohol.

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde”. En situación “Has conducido un vehículo motorizado luego de haber consumido alcohol”, también se omite categoría “No manejo”.

Exposición a situaciones de riesgo

Pensando en los últimos 12 meses, ¿te ha sucedido alguna de las siguientes situaciones?

% Sí


	TOTAL	SEXO		EDAD			NSE			ZONA	
		Hombre	Mujer	15-19	20-24	25-29	Alto	Medio	Bajo	RM	Regiones
Te has subido a un vehículo motorizado conducido por una persona que haya consumido alcohol	28	31★	25▼	21▼	32★	31★	27	27	30	27	29
Has perdido la memoria o la consciencia luego de haber consumido alcohol	10	12	9	10	11	11	10	6▼	13★	9	11
Has perdido la noción de la realidad luego del consumo de drogas y/o estupefacientes como marihuana o cocaína, entre otros	8	9★	6▼	10	6	7	8	6	8	9	7
Has participado en alguna riña o pelea en un lugar público (discotheque, estadio, pub, fiesta, etc.) luego del consumo de alcohol y/o alguna droga	7	9★	5▼	6	9	7	5★	2▼	12★	8	7
Has conducido un vehículo motorizado luego de haber consumido alcohol	6	10★	2▼	3▼	4▼	10★	9★	5▼	5▼	5	7

Entre quienes en los últimos 12 meses han realizado o le ha sucedido alguna de las situaciones de riesgo recién expuestas, exceptuando la pérdida de memoria o consciencia debido al consumo de alcohol, se destaca que los hombres presentan mayores porcentajes estadísticamente hablando que las mujeres.

Muestra: 1.125.

Resguardos post fiestas o carretes

¿Cuál es el principal resguardo que utilizas habitualmente para volver a tu casa cuando tomas alcohol en una fiesta o carrete? %



Los dos principales resguardos que utilizan las y los encuestados cuando participan en fiestas son volver en taxi, uber, radiotaxi o cabify (34%) y no tomar alcohol o consumir casi nada (31%).

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde”

Principales menciones en categoría Otra: Volver a casa caminando/ Volver en bicicleta/ No participar en fiestas o carretes.

Resguardos post fiestas o carretes

¿Cuál es el principal resguardo que utilizas habitualmente para volver a tu casa cuando tomas alcohol en una fiesta o carrete? % Menciones

	TOTAL	SEXO		EDAD			NSE			ZONA	
		Hombre	Mujer	15-19	20-24	25-29	Alto	Medio	Bajo	RM	Regiones
Vuelvo a mi casa en taxi, radiotaxi, uber o cabify	34	34	34	22 ▽	36★	41★	45★	37★	24 ▽	35	33
No tomo nada o casi nada de alcohol	30	26 ▽	35★	32	31	29	27 ▽	34★	30	25 ▽	34★
Me quedo a dormir en el mismo lugar de la fiesta	14	15	13	20★	13 ▽	9 ▽	15	12	15	16	13
Vuelvo a mi casa en micro, metro, buses interurbanos u otra locomoción colectiva	9	12★	6 ▽	9	12★	7 ▽	6 ▽	8	12★	12★	7 ▽
Vuelvo a mi casa con alguien que no haya consumido alcohol	8	6 ▽	9★	11★	4 ▽	8★	5	8	9	6	9
Usualmente no tomo ningún tipo de resguardo	3	4★	2 ▽	4★	1 ▽	3★	1 ▽	0 ▽	6★	3	3

Entre aquellos jóvenes que vuelven a sus casas en taxi, uber, radiotaxi o cabify, las personas jóvenes entre 20-24 años y 25-29 años (36% y 41%, respectivamente) son quienes proporcionalmente más indican hacerlo a diferencia de las y los jóvenes entre 15 y 19 años (22%); lo que también ocurre en los niveles socioeconómicos alto y medio (45% y 37%, en cada caso), por sobre el nivel bajo (24%). Quienes más indican no tomar nada o casi nada de alcohol son las mujeres (35%) y las personas jóvenes que viven en el resto de las regiones (34%). Por último, las y los jóvenes entre 15 y 19 años son quienes más declaran que se quedan a dormir en el lugar de la fiesta (20%).

Muestra: 1.125. Se omiten categorías "Otra", "No sabe" y "No responde"

¡ GRACIAS !



INJUV
Ministerio de
Desarrollo Social

Gobierno de Chile